

CARGO

DENTISTA

CADERNO DE PROVAS

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, com alternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

MARQUE ASSIM



NÃO MARQUE ASSIM



4. A assinatura do(a) candidato(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

"Nada é permanente, exceto a mudança."

6. O tempo máximo de duração da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento do cartão-resposta, contadas a partir da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

11. A folha de texto definitivo da redação dissertativa não poderá ser assinada, rubricada, nem conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca de identificação. Receberá nota zero em casos de: fuga ao tema, de haver texto com quantidade mínima a 10 (dez) linhas e máxima de 20 (vinte) linhas.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível no site <https://www.institutoiasp.org.br/>

BOA PROVA A TODOS!

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 20.

Os desafios de lidar com o envelhecimento dos pais

Uma dura fase marcada por conflitos e dificuldades. É assim que especialistas resumem a forma como o envelhecimento dos pais é encarado diversas vezes, porque muitos filhos não estão preparados para lidar com as exigências desse período.

À medida que a idade avança, uma pessoa precisa de cada vez mais apoio, seja em atividades simples do dia a dia ou mesmo uma ajuda financeira, e isso cobra um preço de quem fica responsável por esses cuidados, como apontam especialistas.

"Em alguns casos, esses filhos experimentam níveis significativos de estresse e sobrecarga ao lidar com as demandas do envelhecimento dos pais, especialmente quando há questões de saúde ou limitações funcionais", diz a psicóloga Deusivania Falcão, professora de Psicogerontologia, área da psicologia que estuda o envelhecimento, da Universidade de São Paulo (USP).

Há, inclusive, um nome para definir esse senso de obrigação dos filhos em apoiar pais mais velhos: responsabilidade filial.

"É uma obrigação baseada em um padrão cultural, relacionado à percepção de que esse é um comportamento socialmente responsável em resposta ao envelhecimento e à dependência dos pais", explica Falcão. "Ou seja, de que é dever do filho adulto ajudar ou ser responsável pelos pais idosos."

O número de pessoas com mais de sessenta anos passou de 20,5 milhões no Censo de 2010 para 32,1 milhões no mesmo levantamento em 2022 – um crescimento de 56% em pouco mais de uma década.

As estimativas apontam que a população de idosos se tornará ainda maior ao longo das próximas décadas.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que o brasileiro viverá cada vez mais: a expectativa de vida, que era de 69,8 anos no início dos anos 2000, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), hoje é de 75,5 anos.

Isso não só aumenta o período em que uma pessoa precisa de auxílio, mas também torna mais comum que os filhos acompanhem diferentes fases do envelhecimento dos pais.

Um ponto importante nesse período é a forma como filhos encaram o envelhecimento dos pais e, como em tantas outras fases da vida, não há uma cartilha universal a seguir.

Essa experiência, dizem especialistas, costuma ser influenciada por padrões familiares do passado e pela forma como uma pessoa foi criada, além de aspectos culturais, históricos, sociais e religiosos de uma família.

"Há vários modelos de envelhecimento e de velhice.

Cada indivíduo envelhece de maneira diferenciada, na singularidade de suas condições genéticas, ambientais, familiares, sociais, educacionais, econômicas, históricas e culturais", diz Falcão.

"Isso tudo depende do tipo de sistema desenvolvido pela família ao longo dos anos."

Um dos principais desafios e motivos de atrito está nos papéis que pais e filhos assumem nessa fase da vida, apontam especialistas.

De um lado, os filhos enxergam uma pessoa fragilizada, adocida e que precisa de cuidados e limitações e protegem seus pais, fazendo com que não se exponham a riscos.

Do outro, há uma pessoa que não quer perder sua autonomia e que até percebe que precisa de cuidados, mas tem dificuldade de aceitar isso, afirma a geriatra Fernanda Andrade.

"Na imensa maioria das vezes, há uma grande diferença entre a visão dos filhos e a dos pais. Os filhos não costumam lidar bem com as escolhas dos pais nesse período", afirma Andrade.

Um dos comentários mais recorrentes que a médica ouve dos filhos é que seus pais são "teimosos" por não seguirem à risca o que os filhos acreditam que eles devem agir.

"É angustiante assistir ao envelhecimento – e, muitas vezes, ao adoecimento – de uma pessoa que se ama e não controlar tudo isso."

Mas, por trás dessa "teimosia", apontam especialistas, estão características atribuídas à idade avançada.

Entre elas, estão o sentimento de solidão, a perda de sentido da vida, a saudade de amigos ou parentes que já faleceram e o medo da morte.

Além disso, o temor de depender dos outros, ainda que sejam os próprios filhos, causa preocupação em muitos idosos e faz com que sejam resistentes a cuidados.

"Imagina passar 50 anos da sua vida totalmente independente e começar a precisar de alguém para ir ao mercado para você, te ajudar a vestir uma roupa ou realizar sua higiene íntima?", diz Andrade.

Para não perder a autonomia, diz Fernanda, muitos idosos não querem parar de dirigir, não aceitam ir ao médico ou não querem abandonar outras atividades que costumavam fazer sozinhos.

Nesse momento, surgem conflitos na relação com os filhos, caso não haja uma comunicação aberta na família sobre as expectativas, desejos e necessidades dos dois lados, pontuam os especialistas.

Muitas vezes, é preciso entender que se trata de uma fase de constante adaptação às demandas que surgem com o passar dos anos.

Por isso, é fundamental perceber que as necessidades dos pais mudam ao longo do tempo.

"O ideal é que os pais conversem muito com os filhos e

mostrem as diferenças geracionais", afirma o médico.

"Esse diálogo é importante, mas é difícil, porque muitos pais não conseguem essa conversa e muitos filhos se consideram senhores da verdade, o que dificulta muito essa situação."

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c842z9en455o>. adaptado.

Questão 01

O número de pessoas com mais de sessenta anos passou de 20,5 milhões no Censo de 2010 para 32,1 milhões no mesmo levantamento em 2022 – um crescimento de 56% em pouco mais de uma década.

Sintaticamente, é correto afirmar que o:

- (A) Núcleo do sujeito é o vocábulo 'pessoas'.
- (B) Predicado é verbo-nominal, logo possui dois núcleos.
- (C) Sujeito é a expressão 'o número de pessoas com mais de sessenta anos'.
- (D) Predicado da oração corresponde a toda frase.
- (E) Período é composto por duas orações.

Questão 02

Há, inclusive, um nome para definir esse senso de obrigação dos filhos em apoiar pais mais velhos: responsabilidade filial.

A opção que contém apenas encontros vocálicos é:

- (A) mais - responsabilidade
- (B) pais - obrigação
- (C) há - para
- (D) dos – nome
- (E) apoiar – filial

Questão 03

O ideal 'é' que os pais 'conversem' muito com os filhos e 'mostrem' as diferenças geracionais, afirma o médico.

Conjugando os verbos destacados no futuro do pretérito do indicativo (é) e no imperfeito do subjuntivo (conversem – mostrem), tem-se:

- (A) O ideal fosse que os pais conversassem muito com os filhos e mostrassem as diferenças geracionais, afirma o médico.
- (B) O ideal fora quando os pais conversavam muito com os filhos e mostravam as diferenças geracionais, afirma o médico.
- (C) O ideal seria se os pais conversaram muito com os filhos e mostraram as diferenças geracionais, afirma o médico.
- (D) O ideal seria se os pais conversassem muito com os filhos e mostrassem as diferenças geracionais, afirma o médico.

- (E) O ideal será quando os pais conversarem muito com os filhos e mostrarem as diferenças geracionais, afirma o médico.

Questão 04

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que o brasileiro viverá cada vez mais: a expectativa de vida, que era de 69,8 anos no início dos anos 2000, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), hoje é de 75,5 anos.

O vocábulo que possui a divisão silábica correta com presença de hiato é:

- (A) Bra-si-le-i-ro
- (B) Geo-gra-fia
- (C) Or-ga-ni-za-çã-o
- (D) Sa-ú-de
- (E) Es-ta-tís-ti-ca

Questão 05

Esse diálogo é importante, mas é difícil, porque muitos pais não conseguem essa conversa e muitos filhos se consideram senhores da verdade, o que dificulta muito essa situação."

Assinale a opção que contenha apenas pronomes:

- (A) da – que – essa
- (B) e – muitos – se
- (C) mas – porque – muitos
- (D) essa – muitos – se
- (E) o – muito – essa

Questão 06

As estimativas apontam 'que' a população de idosos se tornará ainda maior ao longo das próximas décadas.

Morfologicamente, o termo destacado trata-se de:

- (A) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
- (B) Conjunção integrante.
- (C) Pronome relativo.
- (D) Pronome indefinido.
- (E) Sujeito da oração.

Questão 07

Um dos comentários mais recorrentes que a médica ouve dos filhos é que seus pais são teimosos por não 'seguirem' à risca o que os filhos acreditam que eles devem agir.

O verbo destacado na frase encontra-se conjugado no:

- (A) infinitivo pessoal.
- (B) imperfeito do subjuntivo.
- (C) presente do subjuntivo.
- (D) particípio pessoal.

(E) participio regular.

Questão 08

É uma obrigação baseada em um padrão cultural, relacionado 'à percepção (1)' de que esse é um comportamento socialmente responsável em resposta 'ao envelhecimento (2)' e 'à dependência dos pais (3)', explica Falcão.

Em relação ao sinal indicativo de crase, é correto afirmar que, em:

- (A) (1), a crase é obrigatória, pois preenche os requisitos para o seu uso.
- (B) (1), a crase é facultativa, pois preenche os requisitos para o seu uso ou não.
- (C) (3), o uso da crase depende da expressão 'dos pais'; caso contrário, não seria possível.
- (D) (3), a crase é facultativa, pois preenche os requisitos para o seu uso ou não.
- (E) (2), se substituirmos o substantivo masculino por um sinônimo feminino, não haverá crase.

Questão 09

Uma dura fase marcada por conflitos e dificuldades. É assim que especialistas resumem a forma como o envelhecimento dos pais é encarado diversas vezes.

A opção que contém apenas encontros consonantais é:

- (A) vezes – assim
- (B) marcada – forma
- (C) dificuldades – resumem
- (D) diversas – especialistas
- (E) conflitos – fase

Questão 10

[...] porque muitos filhos não estão preparados para lidar com as exigências desse período.

O número de vocábulos presentes que contêm dígrafos é de:

- (A) Dois.
- (B) Um.
- (C) Cinco.
- (D) Três.
- (E) Quatro.

Questão 11

Mas, por trás dessa teimosia, apontam especialistas, estão características atribuídas à idade avançada.

De acordo com as regras de acentuação, é correto afirmar que:

- (A) 'atribuídas' é acentuado por ser um vocábulo paroxítono.

(B) há dois monossílabos tônicos acentuados terminado em 'a(s)'.

(C) 'trás' é acentuado por ser monossílabo tônico terminado em 'a(s)'.

(D) monossílabos tônicos terminados em 'a' são acentuados, como no caso de 'à'.

(E) há dois vocábulos acentuados por serem proparoxítonos.

Questão 12

A expectativa de vida dos brasileiros também sofre modificação.

De acordo com o texto base, qual é a tendência demográfica destacada em relação à população idosa no Brasil?

- (A) A uniformidade na forma como os filhos encaram o envelhecimento dos pais, independentemente dos padrões familiares.
- (B) A estagnação do crescimento da população idosa brasileira desde o Censo de 2010.
- (C) O declínio na quantidade de filhos que acompanham diferentes fases do envelhecimento dos pais.
- (D) O aumento significativo do número de pessoas com mais de sessenta anos ao longo das últimas décadas.
- (E) A diminuição da expectativa de vida da população idosa brasileira desde o início dos anos 2000.

Questão 13

Número de idosos no Brasil aumentou mais de 50% em pouco mais de uma década.

De acordo com o texto base, qual é a definição de responsabilidade filial?

- (A) A obrigação dos filhos em apoiar pais mais velhos, considerada um comportamento socialmente responsável em resposta ao envelhecimento e à dependência dos pais.
- (B) A negligência dos filhos em relação aos pais idosos, ignorando completamente suas necessidades.
- (C) A autonomia dos pais idosos em cuidar de si, sem a necessidade de apoio dos filhos.
- (D) O desinteresse dos filhos em relação ao cuidado com os pais idosos, refletindo uma mudança nos padrões culturais.
- (E) A crença de que os pais idosos devem ser totalmente independentes, sem intervenção dos filhos.

Questão 14

De um lado, os filhos enxergam uma pessoa fragilizada, adoecida e 'que precisa de cuidados e limitações' e protegem seus pais.

A expressão destacada trata-se de uma oração:

- (A) Reduzida de participio irregular.

- (B) Coordenada sindética aditiva.
- (C) Subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Reduzida de infinitivo regular.
- (E) Subordinada substantiva objetiva indireta.

Questão 15

Do outro, há uma pessoa 'que' não quer perder sua autonomia e 'que' até percebe 'que' precisa de cuidados.

Morfologicamente, os termos destacados são, respectivamente:

- (A) Conjunção integrante – pronome relativo – conjunção integrante.
- (B) Conjunção integrante – conjunção integrante – pronome relativo.
- (C) Pronome relativo – pronome relativo – conjunção integrante.
- (D) Conjunção integrante – conjunção integrante – conjunção integrante.
- (E) Pronome relativo – pronome relativo – pronome relativo.

Questão 16

É angustiante 'assistir' ao envelhecimento e, muitas vezes, ao adoecimento.

O verbo destacado, nesta frase, comporta-se como um verbo:

- (A) Transitivo direto com dois objetos diretos.
- (B) Intransitivo.
- (C) Bitransitivo com dois objetos diretos.
- (D) Transitivo indireto com dois objetos indiretos.
- (E) Bitransitivo com um objeto direto e um indireto.

Questão 17

Muitos idosos continuam fazendo atividades que lhe dão satisfação.

De acordo com o texto base, qual é uma das características atribuídas à idade avançada que contribui para a resistência dos idosos em aceitar cuidados e apoio?

- (A) O desejo dos idosos em se tornarem cada vez mais dependentes de seus familiares.
- (B) A conformação em abandonar atividades que costumavam fazer sozinhos.
- (C) A aceitação tranquila da perda de autonomia por parte dos idosos.
- (D) O temor de depender dos outros, mesmo que sejam os próprios filhos.
- (E) O alívio dos idosos ao dependerem completamente dos cuidados de terceiros.

Questão 18

Em alguns casos, os filhos experimentam níveis

significativos de estresse e sobrecarga ao lidar com as demandas do envelhecimento dos pais, especialmente quando há questões de saúde ou limitações funcionais, diz a psicóloga Falcão, professora de área da psicologia que estuda o envelhecimento.

O número de orações presentes no período frasal é de:

- (A) Sete.
- (B) Seis.
- (C) Um.
- (D) Quatro.
- (E) Cinco.

Questão 19

À medida que a idade avança, uma pessoa precisa de cada vez mais apoio, seja em atividades simples do dia a dia ou mesmo uma ajuda financeira, e isso cobra um preço de quem fica responsável por esses cuidados, como apontam especialistas.

Assinale a expressão que contenha substantivo sem adjetivo.

- (A) responsável por esses cuidados
- (B) mais apoio, seja em atividades simples
- (C) um preço de quem fica responsável
- (D) à medida que a idade avança
- (E) ou mesmo uma ajuda financeira

Questão 20

'Isso não só aumenta o período em que uma pessoa precisa de auxílio, mas também' torna mais comum que os filhos acompanhem diferentes fases do envelhecimento dos pais.

A expressão destacada trata-se de uma oração:

- (A) Adjetiva explicativa.
- (B) Coordenada sindética alternativa.
- (C) Coordenada sindética aditiva.
- (D) Reduzida de participio.
- (E) Subordinada substantiva completiva nominal.

Informática

Questão 21

Um usuário pretende imprimir um arquivo que contém 6 páginas, para agilizar esse usuário gostaria de configurar a impressão em que as páginas já sejam impressas na ordem para somente ser necessário grampear, para isso é necessário selecionar a opção. Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao recurso necessário para executar a ação descrita:

- (A) Imprimir Frente e Verso.
- (B) Imprimir Manualmente em dois lados.
- (C) Desagrupado.
- (D) Agrupado.
- (E) Imprimir 6 páginas em 1 Folha.

Questão 22

Esse recurso permite colocar duas ou mais células contínuas numa única célula numa planilha do Excel. Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao contexto acima conforme a célula que contém o texto "Aquecimento por Energia Solar":



- (A) Mesclar.
- (B) Justificar.
- (C) Centralizar.
- (D) Quebrar texto automaticamente.
- (E) Alinhar ao centro.

Questão 23

Para automatizar uma tarefa repetitiva para que você possa fazer a tarefa novamente com um único clique, você pode usar a guia Desenvolvedor em Excel para Mac para gravar e executar uma. Marque a alternativa CORRETA que corresponde a um recurso no Excel descrito:

- (A) Macro.
- (B) Formatação condicional.
- (C) Suplementos.
- (D) Função.
- (E) Fórmula.

Questão 24

É o protocolo principal da web utilizado para comunicação entre os programas servidores de hipertexto e os programas navegadores (ou clientes de hipertexto). Quando for omitido o protocolo, os navegadores assumem que é esse protocolo. Todas as partes do URL (exceto parâmetros) são usados por esse protocolo. Marque a alternativa CORRETA que corresponde a um protocolo de internet descrito.

- (A) http.
- (B) tcp/ip.
- (C) ftp.
- (D) telnet.
- (E) dns.

Questão 25

Antes de imprimir, você pode visualizar o documento e especificar as páginas que você deseja imprimir. Para imprimirmos em um documento que possui 10 páginas somente as páginas 1, 4 a 6, como devemos especificar no campo **Páginas**?

- (A) 1; 4-6.
- (B) 1-6;4.
- (C) 1;4;6.
- (D) 1-4;6.
- (E) 1-6.

Questão 26

Especifica a localização exata de documentos, objetos, ligações, referências e programas executáveis na vastidão da Internet. Em termos simples, qualquer coisa a que nós referimos na Internet tem um. Também são chamados endereços virtuais. Marque a alternativa CORRETA que corresponde a descrição:

- (A) Html.
- (B) FTP.
- (C) URL.
- (D) IP6.
- (E) IP.

Conhecimentos Específicos

Questão 27

O planejamento da intervenção endodôntica ou de proteção do complexo dentino-pulpar é totalmente dependente da condição do tecido pulpar. Assinale dentre as alternativas a seguir, o nome do procedimento de remoção total da polpa coronária com manutenção da polpa radicular vital:

(Fonte: Endodontia Biologia e

Técnica - Lopes e Siqueira).

- (A) Curetagem pulpar.
- (B) Capeamento pulpar direto.
- (C) Pulpotomia.
- (D) Biopulpectomia.
- (E) Necropulpectomia.

Questão 28

A cartinha de Política Nacional de Saúde Bucal exposta pelo Ministério da Saúde-Governo Federal, estabelece algumas medidas para prevenção e tratamento do câncer de boca. E cabe ao cirurgião-dentista estar haptos a tomar tais medidas. São elas, EXCETO:

- (A) Realizar rotineiramente exames preventivos para detecção precoce do câncer bucal, garantindo-se a continuidade da atenção, em todos os níveis de complexidade, mediante negociação e pactuação com representantes das três esferas de governo.
- (B) Estabelecer parcerias para a prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação do câncer bucal com Universidades e outras organizações.
- (C) Acompanhar casos suspeitos e confirmados através da definição e, se necessário, criação de um serviço de referência, garantindo-se o tratamento e reabilitação.
- (D) Oferecer oportunidades de identificação de lesões bucais (busca ativa) seja em visitas domiciliares ou em momentos de campanhas específicas (por exemplo: vacinação de idosos).
- (E) Arcar com recursos próprios ou recursos de terceiros para com as medidas de conscientização e tratamento de enfermidades pré-cancerígenas.

Questão 29

Dentre as alterações periodontais podemos citar a GUN (gingivite ulcerativa necrozante), Além de estresse, alguns outros fatores foram relacionados com uma maior frequência à essa patologia, são eles:

(Fonte: Patologia Oral e Maxilofacial - Neville).

- I. Imunossupressão.
- II. Tabagismo.
- III. Trauma local.
- IV. Mau estado nutricional.

V. Sono inadequado.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Apenas as afirmativas II e V estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas.
- (D) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- (E) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

Questão 30

A fibromatose gengival é um aumento gengival de progressão lenta, ocasionado por um crescimento colagenoso excessivo do tecido conjuntivo fibroso gengival. Esta condição pode ser familiar ou idiopática, e geralmente está associada à algumas síndromes. Analise as afirmativas a seguir:

(Fonte: Patologia Oral e Maxilofacial - Neville).

- I. Síndrome de Down.
- II. Síndrome de Tourette.
- III. Síndrome de Cross.
- IV. Síndrome de Costello.
- V. Síndrome de Ramon.

Após análise, assinale a alternativa CORRETA quanto às síndromes associadas à fibromatose gengival:

- (A) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- (E) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

Questão 31

Os anestésicos locais são de fato as drogas mais comumente administradas em consultórios odontológicos. O correto emprego de cada técnica anestésica garante a ausência de sintomatologia dolorosa durante os procedimentos clínicos. Dito isso, correlacione a técnica anestésica (Coluna I) com a região a ser anestesiada (Coluna II).

(Fonte: Manual de Anestesia Local - Malamed).

Coluna I

1. Bloqueio do nervo alveolar superior posterior.
2. Bloqueio do nervo alveolar superior médio.
3. Bloqueio do nervo alveolar superior anterior.
4. Bloqueio do nervo palatino maior.
5. Bloqueio do nervo nasopalatino.
6. Bloqueio do nervo alveolar inferior.

Coluna II

(__) Polpa dos pré-molares superiores e raiz mesiovestibular do primeiro molar superior.

(___) Polpa dos incisivos centrais superiores até o canino do lado anestesiado (essa técnica pode em alguns pacientes anestésias também a polpa dos pré-molares superiores).

(___) Dentes inferiores até a linha média, corpo da mandíbula, mucoperiósteo vestibular, mucosa anterior ao forame mental, dois terços anteriores da língua.

(___) Polpa do terceiro, segundo e primeiro molares superiores (podendo ou não anestésias a raiz mv do primeiro molar superior).

(___) Porção posterior do palato duro e seus tecidos moles sobrejacentes, anteriormente até o primeiro pré-molar, e medialmente até a linha média.

(___) Porção anterior do palato duro (tecidos moles e duros) bilateralmente a partir da face mesial do primeiro pré-molar superior direito até o primeiro pré-molar superior esquerdo.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) 2, 3, 6, 1, 4, 5.
- (B) 4, 5, 2, 1, 3, 6.
- (C) 2, 4, 6, 5, 1, 3.
- (D) 6, 5, 2, 3, 1, 4.
- (E) 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Questão 32

Dentre as técnicas anestésicas empregadas para procedimentos em dentes inferiores ou intervenção em tecido duro e mole da mandíbula, podemos citar a técnica de Gow-Gates. Essa técnica tem a capacidade de anestésias diversos ramos nervosos. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta quanto aos nervos anestésias pela técnica de Gow-Gates.

(Fonte: Manual de Anestesia Local - Malamed).

I. Nervo alveolar inferior.

II. Nervo mental.

III. Nervo lingual.

IV. Nervo milo-hióideo.

V. Nervo auriculotemporal.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- (B) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
- (E) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas.

Questão 33

"A duração do tratamento com AINEs (anti-inflamatórios não esteroideais) na clínica odontológica quase sempre é restrita. Por isso, a incidência de efeitos adversos clinicamente significativos é muito mais rara do que na

clínica médica. Apesar disso, a agência nacional de vigilância sanitária (Anvisa) faz algumas considerações gerais a respeito da prescrição dos AINEs baseada na literatura científica e também são de interesse do cirurgião-dentista" (Trecho do livro *Terapêutica Medicamentosa em Odontologia - Andrade*). Dito isso, analise as afirmativas a seguir quanto as considerações da Anvisa a respeito da prescrição dos AINEs:

I. A ação analgésica e anti-inflamatória dos inibidores seletivos da COX-2 não é superior àquela apresentada pelos inibidores não seletivos.

II. O uso dos coxibes deve ser considerado exclusivamente para pacientes com risco aumentado de sangramento gastrointestinal, mas sem risco simultâneo de doença cardiovascular.

III. Na prescrição de qualquer inibidor da COX-2, deve-se usar a menor dose efetiva pelo menor tempo necessário de tratamento.

IV. É contraindicado o uso de inibidores seletivos da COX-2 em pacientes que fazem uso contínuo de antiagregantes plaquetários, como a aspirina ou o clopidogrel.

V. O uso concomitante dos AINEs com certos anti-hipertensivos pode precipitar uma elevação brusca da pressão arterial sanguínea.

Após a análise, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
- (E) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.

Questão 34

Quando organizamos a atenção à saúde bucal por meio do ciclo de vida do indivíduo, é importante dar atenção a alguns fatores que são inerentes a cada fase do desenvolvimento humano. Na fase de criança é importante observar que alguns fatores, denominados hábitos deletérios, predisõem à má oclusão e que devem ser trabalhados no processo educativo. Analise as afirmativas a seguir:

(Fonte: Caderno de Atenção Básica n-17

- Ministério da Saúde - Governo Federal).

I. Sucção de chupeta.

II. Sucção digital.

III. Deglutição atípica.

IV. Hábito de roer unha.

V. Respiração bucal.

Após análise, assinale a alternativa CORRETA quanto aos hábitos deletérios a se dar atenção nessa fase:

- (A) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
- (B) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

- (C) Apenas as afirmativas III e V estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- (E) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

Questão 35

A ação dos anti-inflamatórios pode se dar de diversas maneiras, por exemplo a ação inibitória de COX (ciclooxigenase). Os fármacos deste grupo podem ser seletivos ou não seletivos. Dito isso, dentre as alternativas a seguir, assinale um fármaco não seletivo para COX-2:

(Fonte: Terapêutica Medicamentosa em Odontologia - Andrade).

- (A) Etoricoxibe.
- (B) Celecoxibe.
- (C) Ibuprofeno.
- (D) Nimesulida.
- (E) Meloxicam.

Questão 36

O uso de fármacos para prevenção e controle da dor, é muito comum na odontologia. A respeito da ação destes fármacos, correlacione as colunas a seguir.

(Fonte: Terapêutica Medicamentos em Odontologia - Andrade).

Coluna I

- I. Analgesia preemptiva.
- II. Analgesia preventiva.
- III. Analgesia perioperatória.

Coluna II

(__) Tem início antes do estímulo nocivo, ou seja, previamente ao trauma tecidual. Neste regime, são empregados fármacos que previnem a hiperalgesia, que pode ser complementada pelo uso de anestésicos locais de longa duração.

(__) Tem início imediatamente após a lesão tecidual, porém antes do início da sensação dolorosa. Em termos práticos, a primeira dose do fármaco é administrada ao final do procedimento (com o paciente ainda sob os efeitos da anestesia local), seguida de doses de manutenção no pós-operatório, por curto prazo.

(__) Iniciado antes da lesão tecidual e mantido no período pós-operatório imediato. A justificativa para isso é de que os mediadores pró-inflamatórios devem manter-se inibidos por um tempo mais prolongado, pois a sensibilização central pode não ser prevenida se o tratamento for interrompido durante a fase aguda da inflamação.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) 1, 3, 2.
- (B) 3, 2, 1.
- (C) 2, 1, 3.
- (D) 1, 2, 3.

- (E) 3, 1, 2.

Questão 37

O cirurgião a serviço da Estratégia de Saúde da Família (ESF) detêm de algumas atribuições específicas. Analise as afirmativas a seguir:

(Fonte: Política nacional de atenção

básica. Gov.com - Governo Federal).

I. Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal.

II. Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade.

III. Realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares.

IV. Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea.

V. Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais.

VI. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.

VII. Realizar supervisão técnica do técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB).

VIII. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS (Unidade Básica de Saúde).

Após análise, assinale a alternativa CORRETA quanto às atribuições do cirurgião-dentista na ESF:

- (A) Apenas a afirmativa VI está incorreta.
- (B) Apenas as afirmativas I, II, V, VII e VIII estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas III, V e VI estão incorretas.
- (D) As afirmativas I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII estão corretas.
- (E) Apenas as afirmativas I, III, IV e VII estão corretas.

Questão 38

A hiperplasia gengival medicamentosa se refere a um crescimento anormal dos tecidos gengivais, secundário ao uso de uma medicação sistêmica. São medicações associadas à hiperplasia gengiva, EXCETO:

- (A) Anti-inflamatórios não esteroideais AINEs.
- (B) Anticonvulsivantes.

- (C) Ciclosporina.
- (D) Bloqueadores do canal de cálcio.
- (E) Contraceptivos orais.

Questão 39

Para um correto planejamento em traumatismo dentários, é importante diagnosticar corretamente as lesões traumáticas dos tecidos de sustentação do dente. Dito isso, correlacione as colunas I e II.

(Fonte: Traumatologia Bucomaxilofacial e Reabilitação Morfofuncional - José A. G. Pereira de Oliveira).

Coluna I

1. Concussão.
2. Subluxação.
3. Luxação extrusiva.
4. Luxação lateral.
5. Luxação intrusiva.
6. Avulsão.

Coluna II

(__) É um traumatismo de media intensidade, mas Pode ocasionar o rompimento de algumas fibras do ligamento periodontal e alguns vasos sanguíneos, causando hemorragia discreta e edema no ligamento periodontal. Poderá apresentar mobilidade leve.

(__) Quando ocorre um impacto frontal, deslocando o dente de seu eixo axial, forçando a coroa para palatino/lingual e a raiz para vestibular.

(__) É um traumatismo leve, originado por impacto de pequena intensidade, que atinge o dente e o ligamento periodontal. Pode ocasionar o rompimento de algumas fibras do ligamento periodontal e alguns vasos sanguíneos, causando hemorragia discreta e edema no ligamento periodontal.

(__) É o resultado de um impacto axial, que empurra o dente em sentido apical para dentro do processo alveolar, podendo variar de poucos milímetros, até total desaparecimento do dente para dentro do osso alveolar.

(__) É um deslocamento parcial do dente para fora de seu alvéolo, que pode variar de um nível quase imperceptível até vários milímetros.

(__) É a lesão traumática mais grave dos tecidos de sustentação do dente, a OMS define como desalojamento completo do dente do alvéolo dentário.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) 5 - 4 - 3 - 1 - 2 - 6.
- (B) 3 - 5 - 6 - 4 - 1 - 2.
- (C) 4 - 5 - 6 - 2 - 3 - 1.
- (D) 2 - 5 - 4 - 3 - 1 - 6.
- (E) 2 - 4 - 1 - 5 - 3 - 6.

Questão 40

De acordo com a política nacional de saúde bucal, para instituir a aplicação tópica de flúor recomenda-se levar em consideração a situação epidemiológica (risco) de diferentes grupos populacionais do local onde a ação será realizada. A utilização de aplicação tópica de flúor com abrangência universal é recomendada para populações nas quais se constate uma ou mais das seguintes situações, EXCETO:

(Fonte: Política Nacional de Saúde Bucal - Governo Federal).

- (A) Menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos de idade.
- (B) Exposição a flúor na água há menos de 5 anos.
- (C) Exposição à água de abastecimento contendo naturalmente baixos teores de flúor (até 0,54 ppm F).
- (D) Exposição à água de abastecimento com flúor desde a erupção dos primeiros elementos dentários decíduos.
- (E) CPOD maior que 3 aos 12 anos de idade.

REDAÇÃO DISSERTATIVA

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO:

1. Você deve elaborar um texto dissertativo com, no mínimo, 10 (dez linhas) e, no máximo, 20 (vinte) linhas, ambos sem contar o título;
2. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação terá o número de linhas copiadas desconsiderado para a contagem de linhas;
3. Receberá nota zero a redação que:
 - i. não observar as orientações presentes no caderno de questões;
 - ii. tiver menos de 10 (dez) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”;
 - iii. tiver mais de 20 (vinte) linhas escritas, sendo considerada fora dos parâmetros do certame;
 - iv. estiver em branco ou apresentar textos sob forma não articulada verbalmente;
 - v. fugir ao tema ou não atender ao tipo dissertativo;
 - vi. apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto;
 - vii. apresentar letra ilegível ou incompreensível, que impossibilite a avaliação por parte da banca;
 - viii. for escrita total ou parcialmente a lápis; ou
 - ix. apresentar texto escrito com expressões injuriantes, discriminatórias e/ou abusivas.

Para produzir a sua redação, leia atentamente os textos motivadores apresentados a seguir:

TEXTO 1

Como ser multitasking nos afeta?

A multitarefa (multitasking, em inglês) consiste em tentar realizar duas ou mais tarefas ao mesmo tempo, como, por exemplo, dirigir para o trabalho enquanto ouve um programa de rádio, conforme definido pelo artigo “Multicosts of Multitasking” (“Multi Custos da Multitarefa”), publicado na revista científica *Cerebrum*.

De acordo com o artigo, o multitasking leva a pessoa a mudar repetidamente de tarefas ou deixar uma sem terminar para fazer a outra. Embora o conceito e seus efeitos ainda estejam em processo de definição, já existem alguns consensos sobre como a multitarefa impacta as pessoas.

1. A multitarefa está associada a um menor rendimento

Um dos efeitos da multitarefa está relacionado ao fato de que as pessoas quase sempre demoram mais para concluir uma tarefa e a fazem com mais erros quando trocam muito de atividade ao invés do que acontece quando ficam com apenas uma execução de cada vez, alerta o artigo publicado no *Cerebrum*. Consequentemente, “quando se muda de tarefa, são perdidos os benefícios de fazer algo de forma automática e a eficiência que vêm de manter o foco em uma única demanda”.

2. A multitarefa tem efeitos na estrutura cerebral

Um estudo da Universidade de Sussex investigou as relações entre multitarefa dos meios e estrutura cerebral, mostrando que esta última pode ser alterada após exposição prolongada a novos ambientes e experiências. Especificamente, o estudo revelou que as pessoas que relataram maiores quantidades de multitarefa apresentavam uma menor densidade de matéria cinzenta no córtex cingulado anterior.

3. A multitarefa pode ser a faísca para estimular a criatividade

No entanto, nem todos os efeitos de realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo são negativos, embora o contexto possa ser importante, alerta o artigo. Como exemplo, ele aponta que dados recentes sugerem que existem certos domínios, como a resolução criativa de problemas, que podem se beneficiar da troca de tarefas, colocando-se o foco em um único problema. Por isso, o texto conclui que “é importante pesar os custos e os benefícios da multitarefa”, lembrando que ainda há muito a ser investigado.

Retirado e adaptado de: National Geographic Brasil. Disponível em: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/ciencia/2022/11/como-ser-multitasking-nos-afeta-3-efeitos-da-multitarefa> Acesso em: 06 mar., 2024.

TEXTO 2

IBERDROLA

Dicas para melhorar seu perfil multitarefa no trabalho

Crie uma visão geral
Escreva as tarefas em uma lista, gráfico ou calendário para se organizar e estabelecer um prazo.

Converse com seus colegas de trabalho
Colabore com outras pessoas para organizar melhor as tarefas que devem ser realizadas em cada momento e verificar quem pode fazê-las.

Priorize as tarefas
Organize-as por ordem de importância: determine qual delas é mais urgente e concentre-se nesse trabalho (leve em conta o tempo e o esforço).

Faça descansos
A multitarefa exige um grande esforço mental, por isso convém parar alguns minutos para se desconectar.

Estabeleça limites
Conheça seus próprios limites para não se esgotar e gerencie melhor tanto seu tempo quanto suas tarefas.

Estabeleça metas
Anotar as tarefas que você concluir e comemore essas conquistas para manter a motivação.

Mantenha-se organizado
Utilize as novas tecnologias para implementar ferramentas de gestão e finalizar suas tarefas com sucesso.



Fonte: Ganttic.

Disponível em: <https://www.iberdrola.com/talentos/multitasking> Acesso em: 06 mar., 2024.

TEXTO 3



Disponível em: <https://www.meetingdecisions.com/blog/science-says-youre-not-as-good-at-multitasking-as-you-think> Acesso em: 06 mar., 2024.

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação e experiências, redija um texto dissertativo em modalidade escrita, empregando a norma culta da língua portuguesa, com extensão entre 10 e 20 linhas, sobre o tema “Multitarefas no mundo profissional: vantagens, caminhos e prejuízos”. Elabore seu texto pautando-o em argumentos, redija-o de forma coesa e coerente com o tipo textual solicitado.

REDAÇÃO DISSERTATIVA - FOLHA DE RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	